



## Organizace péče

Doporučuje se vypracování formalizovaného protokolu/standardu pro včasný záchyt těhotných se známkami sepse a definování procesu péče po aktivaci systému včasného varování na konkrétním pracovišti. Důležité je zavedení tzv. *rapid response systému* (dále také RRS, systém časného varování), kdy k aktivaci systému může dojít už na podnět středního zdravotnického personálu. Smyslem systému „časného varování“ je zabránit u pacientů časové prodlevě zahájení léčby. Časová prodleva v léčebném postupu zhoršuje klinický výsledek exponenciálně.

	3	2	1	0	1	2	3
Dechová frekvence (počet dechů/min)	≤8			9 - 18	19 - 24	25 - 29	≥30
Saturace krve kyslíkem (%)	≤90		91-94	95 - 100			< 92% na O <sub>2</sub>
Srdeční frekvence (puls/min)		≤40	41 - 50	51 - 99	100 - 110	111 - 129	≥130
Systolický tlak (mmHg)	≤70	71-80	81 - 90	91 - 139	140 - 159	160 - 169	≥170
Diastolický tlak (mmHg)			≤45	46 - 89	90 - 99	100 - 109	≥110
Stav vědomí			agitace nebo zmatenost	bdělost	reakce na hlasový podnět	reakce na algický podnět	řádná reakce
Tělesná teplota (°C)		≤35,0	35,1 - 36,0	36,1 - 37,7	37,8 - 38,3	≥38,4	
Diuréza (ml/hod)	anurie	≤20	21 - 30	≥31			

NÍZKÉ RIZIKO 1-2	STŘEDNÍ RIZIKO 3-5	VYSOKÉ RIZIKO ≥6
Informovat vedoucí porodní asistentku	Informovat vedoucí porodní asistentku	Informovat vedoucí porodní asistentku
Zkontrolovat těhotnou za 1 hodinu	Zkontrolovat pacientku za 30 minut	Kontrolovat pacientku každých 5-15 minut v závislosti na klinickém stavu
Pokud není zlepšení stavu, informovat lékaře	Pokud není zlepšení stavu, informovat lékaře (porodník/anesteziolog)	Informovat vedoucího lékaře (porodník/anesteziolog)
	Vyhodnotit a vytvořit plán péče	Vyhodnotit a vytvořit plán péče
	Došlo s léčbou ke zlepšení stavu?	Došlo s léčbou ke zlepšení stavu?
	ANO NE	ANO NE
	Standardní odd.	Odd. intermediární péče nebo JIP
	Odd. intermediární péče skóres3	
	Lékařská kontrola za 30 min	Lékařská kontrola každých 15 min